


فعالیت

عدم فعالیت شدید. فعالیت نسبی و سبک و محدود به کارهای روزانه داشته باشید.

نزدیکی یک شب در میان از یک روز بعد از IUI به مدت یک هفته



احتمال وقوع حاملگی

به طور متوسط ۱۰-۱۵ درصد گزارش شده و حدود ۶۰ درصد زوجها پس از چند دوره درمان به حاملگی دست می یابند.

اقدامات قبل از عمل

- ✓ قبل از رفتن به اتاق عمل لباس تعویض کنید.
- ✓ در صورت داشتن سابقه حساسیت دارویی یا غذایی یا بیماری خاص، پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید.
- ✓ قبل از انجام IUI از خالی کردن مثانه خودداری کنید.


رژیم غذایی

ممنوعیت غذایی وجود ندارد.

امروزه یکی از روش های نوین ابداعی درمان ناباروری، تلقیح داخل رحمی یا IUI می باشد.

مراحل انجام

این روش نسبتا ساده و بدون درد بوده، در مطب پزشک و بدون نیاز به بیهوشی نیز قابل انجام است. در این روش مایع حاوی انزالی اسپرمی متحرک و طبیعی پس از شستشو در آزمایشگاه از طریق لوله ی باریکی از دهانه ی رحم، به رحم منتقل می شود.





دانشگاه علوم پزشکی دزفول
بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)
راهنمای بیمار و خانواده

تلقیح داخل رحمی (IUI)



بازنگری تابستان ۱۴۰۱

دفتر آموزش سلامت همگانی

تلفن پیغامگیر آموزش سلامت: ۰۶۱-۴۲۴۲۷۱۵۰

تلفن بیمارستان: ۰۶۱-۴۲۴۲۲۰۴۱-۹

آدرس سایت: <http://ghospital.dums.ac.ir>

تأیید پزشک متخصص

کد: ۲۳۵

مرکز تحقیقاتی و درمان ناباروری دزفول

آدرس: دزفول ابتدای جاده دزفول -

اندیمشک، روبروی مجتمع فرهنگی

بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)

مشاور علمی: دکتر سیما جنتی

(جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی)

تهیه کننده:

سمیه قمشی (کارشناس پرستاری

زهره خلیلی (کاردانی اتاق عمل)

بازنگری: الهه جرجانی (سوپروایزر آموزش

سلامت)

منبع: text book of assisted

Reproductive techniques

دارو

داروهای تجویز شده را طبق دستور

پزشک معالج مصرف نمایید.



زمان مراجعه بعدی

دو هفته بعد از IUI تست β HCG انجام شود و به

مرکز یا مطب پزشک مراجعه کنید.

