

جنین یا جنین ها توسط لوله ی باریک مخصوص، بدون بیهوشی به داخل رحم منتقل می شوند.

اقدامات و توصیه های قبل از عمل

✓ شب قبل از عمل، شام سبک میل کرده و از ساعت ۱۲ شب ناشتا باشید.

✓ پاک کردن آرایش و لاک ناخن.

✓ قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آلات، اجسام فلزی، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را خارج کرده و تحویل همراه دهید.

✓ کلیه لباس ها (لباس زیر، جوراب و...) را در آورده و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید.

✓ در صورت داشتن سابقه بیماری و سابقه حساسیت دارویی یا غذایی، مصرف هرگونه دارو یا عدم ناشتا بودن، پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید.

✓ قبل از عمل، از خالی کردن مثانه خودداری کنید.

فعالیت

✓ در صورت انتقال جنین تحت بیهوشی، برای خروج از بستر، ابتدا به پهلو بچرخید و مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمایید، در صورت نداشتن سر گیجه و تاری دید راه بروید.

✓ از فعالیت شدید و بلند کردن اشیای سنگین و هرگونه فشار شکمی خودداری کنید. فعالیت به صورت نسبی و محدود به کارهای روزانه باشد.

✓ در صورت داشتن نزدیکی با حداقل فشار فیزیکی همراه باشد.

✓ ۲۴ ساعت بعد از انتقال می توانید با آب ولرم دوش بگیرید.

✓ استراحت به صورت نسبی باشد، اکیدا از استراحت مطلق و بی حرکتی به علت احتمال بروز ترومبوز وریدی و یبوست و تاثیر بر روی لانه گزینی پرهیز نمایید.

رژیم غذایی و تغذیه

از خوردن غذاهای نفاخ و کنسروی حاوی مواد نگهدارنده، داروهای گیاهی و دمنوش های گیاهی خودداری کنید.



مراقبت

در صورت درد و خونریزی و یا هرگونه حساسیت دارویی به مطب پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید.



دانشگاه علوم پزشکی دزفول
بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)
راهنمای بیمار و خانواده

آموزش به بیمار حین بستری و ترخیص

عمل انتقال جنین



بازنگری تابستان ۱۴۰۱

دفتر آموزش سلامت همگانی

تلفن پیغامگیر آموزش سلامت: ۰۶۱-۴۲۴۲۷۱۵۰

تلفن بیمارستان: ۰۶۱-۴۲۴۲۲۰۴۱-۹

آدرس سایت: <http://ghospital.dums.ac.ir>

تایید پزشک متخصص

کد: ۲۳۴

مرکز تحقیقاتی و درمان ناباروری دزفول

آدرس: دزفول ابتدای جاده دزفول-
اندیمشک، روبروی مجتمع فرهنگی

بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)

مشاور علمی: دکتر سیما جنتی

(جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی)

تهیه کننده:

سمیه قمشی (کارشناس پرستاری

زهرا خلیلی (کاردانی اتاق عمل)

بازنگری: الهه جرجانی (سوپروایزر آموزش

سلامت)

منبع: text book of assisted

Reproductive techniques

دارو

داروهای تجویز شده را طبق دستور پزشک معالج
مصرف نمایید.



زمان مراجعه بعدی

دو هفته بعد از انتقال جنین تست β HCG انجام

شود و به مرکز یا مطب پزشک مراجعه کنید.

